


TUBERKULOZA (TBC)

bolest prošlosti, sadašnjosti ali i
budućnosti





- 
- BCG vakcina je vakcina protiv tuberkuloze, obavezna je i dobija se još u porodilištu
 - obuhvat populacije ovom vakcinom je oko 97%

- Stopa obolelih od TBC-a u Srbiji je 12/100 000 stanovnika
u Beogradu 11/100 000 stanovnika

podaci iz 2016.godine

Institut za javno zdravlje Srbije


- 
- najviše oboljevaju deca uzrasta 15 do 19 godina i osobe preko 50 godina starosti
 - češće oboljevaju osobe muškog pola
 - stopa dobrog ishoda lečenja trenutno je oko 57 %
 - cilj koji je postavila SZO (WHO) je preko 80% dobrog ishoda lečenja

- 
- Problem u lečenju multirezistentne TBC
 - Preporuke – šema lečenja:
 - prva 2 meseca 4 leka
 - sledeća 4 meseca 2 leka


- **LATENTNA TUBERKULOZNA INFEKCIJA**

(bakterije su prisutne u telu, ali ih nema dovoljno da bi izazvale bolest ili se prenele na drugu osobu)

oko 1 000 000 ljudi u Srbiji
ima latentnu tuberkuloznu infekciju!


- 
- Ako bakterije postanu aktivne i umnože se, latentna tuberkulozna infekcija može preći u bolest
 - Smatra se da će 1 od 10 osoba sa latentnom tuberkuloznom infekcijom da razvije bolest


- 
- Koga treba testirati na latentnu tuberkuloznu infekciju?
 - osobe iz kontakta sa obolelim
 - osobe sa drugim zdravstvenim problemima koji otežavaju borbu sa tuberkuloznom bolešću (karcinomima koji su na hemoterapiji, sa transplantiranim organima, na dijalizi, sa HIV infekcijom, na biološkoj terapiji)
 - osobe koje provode duže vreme u bolnicama i kolektivnim smeštajima (zatvori, kazneno popravni domovi, privremeni smeštaji)

- 
- Latentnu tuberkuloznu infekciju moguće je dokazati:

kožnim testom (PPD proba)

i/ili testiranjem krvi QuantiFERON testom


- 
- Za postavljanje dijagnoze latentne tuberkulozne infekcije, osim pozitivnih rezultata testova, uslov je normalan RTG snimak grudnog koša i odsustvo simptoma aktivne TB bolesti


- 
- Lečenjem latentne tuberkulozne infekcije može se sprečiti bolest

Terapijski režimi:

6 meseci – upotreba jednog leka

3 meseca – upotreba dva leka

- 
- Testiranje latentne tuberkulozne infekcije je dostupno na teret sredstava RFZO u ustanovama:
 - ❖ Institut za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu
 - ❖ Institut za plućne bolesti Vojvodine

- 
- Eliminacija tuberkuloze kao javnozdravstvenog problema zahteva povećanje obuhvata testiranjem latentne tuberkulozne infekcije i primene hemioprolifakse